

vector :

Hermann Weyl (1885 - 1955)

"universalism" style mathematician
theoretical physicist
philosopher

↓

symmetry : invariant under transformation/
operation

物理定律的现象 :

平移不变性 : 燕京校园 →

天安门 → 王子屯 (Princeton)

观察一个实验, 不变。

(homogeneity)

|| h2u m0 d30 / ni : 2ti |

旋转不变性 (isotropy) 各向同性

reference frame 转动后 物理定律不变

矢量在这些要求下 应运而生 数学技巧



位移 displacement, 有方向, 有大小

$$\vec{r} = r \hat{r}$$

(符号) 长度 (magnitude) unit vector 方向 (direction)


\mathbf{r} (boldface type in print)

$$\vec{A} = A \hat{A}$$

parallelogram /, para 'ellogram

平行四边形


Law of addition of vectors



$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$




$$\vec{A} = \vec{C} - \vec{B}$$



②

推演:



$$\vec{E} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}$$

$$\vec{B} = k \vec{A}$$

↓ 常数, 缩放

平行四边形法则中，体现了平移不变性，
 矢量的 大小，方向 与其所处位置无关，
 这里自包含 Euclidean space (平直空间)

选用笛卡尔坐标


(从 $d=2$) 开始

$$\vec{r} = r \hat{e} = x \hat{x} + y \hat{y}$$

$$= x' \hat{x}' + y' \hat{y}' \quad (x', y')$$

(矢量还是那个矢量) 两个分量

有大小，有方向就是矢量吗？



$$P: (x, y)$$

$$(x', y')$$

O, O' 重合

reference frame rotates

counter clock wise by θ / theta

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta = OM + PN$$

$$y' = y \cos \theta - x \sin \theta = RQ - MR$$

一个矢量在不同坐标系中的旋转

即在旋转前后的坐标系中有如上的关系

问1: 对于一个矢量, 旋转前后有什么保持不变呢?

$$\begin{aligned} \text{长度: } \vec{A} \cdot \vec{A} & \quad \text{inner product} \\ & = A^2 \quad \quad \quad \text{dot product} \end{aligned}$$


更一般地, $\vec{A} \cdot \vec{B}$ 不变

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \hat{x} + A_y \hat{y}) \cdot (B_x \hat{x} + B_y \hat{y})$$

$$= A_x B_x + A_y B_y$$

$$\hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{y} \cdot \hat{x} = 0 \quad (\text{orthogonal})$$

正交, 互相垂直.



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

lesser angle

\vec{A} 到 \vec{B} , \vec{B} 到 \vec{A} 一样

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

物理举例: 作功 $\vec{F} \cdot \vec{s}$

力乘以在力的方向上的位移

(位移投影到力的方向)

$$\vec{A} \cdot \vec{A} \qquad \cos \theta \qquad \vec{B} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$$

$\vec{c} \cdot \vec{c}$ 亦为保持不变

$$(\vec{A} + \vec{B}) \cdot (\vec{A} + \vec{B})$$


$$(\vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{B} \cdot \vec{A}) + \vec{A} \cdot \vec{A} + \vec{B} \cdot \vec{B}$$

↓ 保持不变

从欧拉公式看复数旋转：

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

(复数 \leftrightarrow 三角函数)



在 $x'Oy'$ 坐标系里写 \vec{p} 的两个分量 (x', y')

相当于坐标系没有转动，角度是反向 (即顺时针)

转动 θ 角

$$(x' + iy') = (x + iy) e^{-i\theta} = (x + iy) (\cos\theta - i\sin\theta)$$

$$= x\cos\theta + y\sin\theta + i(y\cos\theta - x\sin\theta)$$

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

坐标旋转，矢量不动



坐标不动，矢量反转

$$e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = e^{i\theta_1} e^{i\theta_2}$$

连续两次旋转，

$$e^{i(\theta_1 + \theta_2)} (x + iy) = e^{i\theta} (x + iy)$$

$\theta = \theta_1 + \theta_2$

可构成一个群，此处不展开

连续两次操作 \Rightarrow 一个操作

$$\begin{aligned} \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) &= e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \\ &= (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) \\ &= \cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2 + i(\sin\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \sin\theta_2) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos\theta_1 \cos\theta_2 - \sin\theta_1 \sin\theta_2 \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin\theta_1 \cos\theta_2 + \cos\theta_1 \sin\theta_2 \end{cases}$$

或者通过 trigonometry 方式书写

pseudo vector (axial vector) $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ reflection $\xrightarrow{(-1)}$ mirror

reflection : (improper rotation)

$$\vec{a} \rightarrow -\vec{a}$$

$$\vec{b} \rightarrow -\vec{b}$$

$$\vec{c} \rightarrow +\vec{c}$$

opposed to true (polar) vector
reflection \leftrightarrow mirror
image